



ALEITAMENTO MATERNO:  
mudando vidas e melhorando sua saúde  
**AMAMENTAÇÃO E TOXICOLOGIA E SAÚDE AMBIENTAL**

**A terapia medicamentosa materna é, na grande maioria das vezes, compatível com a amamentação. Por outro lado, os riscos da alimentação do lactente com fórmulas infantis são significativos e não devem ser banalizados.**

TÍTULO DO ARTIGO: Uso de medicamentos e outras substâncias pela mulher durante a amamentação

INTERFACE: com o Departamento de Toxicologia e Saúde Ambiental.

REFERÊNCIA: Sociedade Brasileira de Pediatria. Guia prático de atualização: uso de medicamentos e outras substâncias pela mulher durante a amamentação. Porto Alegre: SBP, 2017.

TEXTO ORIGINAL:

[http://www.sbp.com.br/fileadmin/user\\_upload/Aleitamento - Uso Medicam durante Amament.pdf](http://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/Aleitamento_-_Uso_Medicam_durante_Amament.pdf)

## RESUMO

### Introdução

O uso de medicamentos pela nutriz, uma prática comum que se inicia ainda na maternidade e persiste durante todo o período da lactação é, sabidamente, um fator de risco para a interrupção precoce do aleitamento materno.

Os pediatras, apesar de não prescreverem medicamentos para as nutrizes, são frequentemente questionados por elas ou por colegas de outras especialidades sobre a segurança dos medicamentos para uso durante a lactação. O conhecimento científico, incluindo o farmacológico, é dinâmico e mutável. Na atualidade, vários fármacos são lançados no mercado e numerosas pesquisas são publicadas anualmente sobre a segurança do uso de medicamentos e outras substâncias durante a lactação. Assim, faz-se necessária a constante atualização acerca desse tema pelos pediatras.

O número de mulheres que desmamam os seus filhos para utilizar medicamentos é significativo. Pesquisas em muitos países estimam que 90 a 99% das mulheres que amamentam receberão pelo menos alguma medicação durante a primeira semana após o parto. Outros estudos sugerem que o uso de medicamentos é uma das principais razões pelas quais as mulheres interrompem a amamentação prematuramente.

### Considerações finais

A terapia medicamentosa é, na grande maioria das vezes, compatível com a amamentação. Assim, raramente o desmame deve ser indicado por causa do uso de medicamento pela nutriz. É inaceitável que o médico indique o desmame meramente

por desconhecimento acerca da segurança do medicamento para uso na lactação, privando a criança e a mãe dos efeitos positivos da amamentação sobre sua saúde. Os riscos da alimentação da criança pequena com fórmulas infantis são significativos e não devem ser banalizados.