



TROMBOPED

No Brasil ainda faltam muitas informações e elucidações sobre o TEV pediátrico. TROMBOPED é o primeiro estudo nacional a investigar a incidência e fatores de risco envolvidos com Tromboembolismo Venoso Pediátrico no Contexto Intra-Hospitalar.

ATENÇÃO AO TEV

O Tromboembolismo venoso é uma importante causa de morte evitável em ambientes hospitalares.

FATORES RELACIONADOS AO TEV INFANTIL



- Obesidade
- Infecção
- Uso de cateter central
- Ventilação Mecânica
- Cirurgias
- Internação prolongada ou em CTI
- Imobilidade
- Uso de contraceptivos orais

Fonte: Mahajerin A, Front. Pediatr 2017

93%

Dados preliminares do estudo TROMBOPED indicam que 93% das crianças que desenvolveram TEV, apresentavam antes do diagnóstico sinais e sintomas sugestivos, entre eles: dor, edema e alteração de cor. Além da avaliação clínica, o exame de imagem também é muito importante na confirmação do diagnóstico.

AUMENTO DA INCIDÊNCIA DE TEV PEDIÁTRICO

A cada 10.000 admissões hospitalares, 58 crianças são afetadas por TEV nos EUA.



ALTA LETALIDADE

No Canadá, a taxa de mortalidade varia de 9 a 17% entre os pacientes com TEV.

Mais de 20% das mortes ocorrem dentro de 30 dias.



Fonte: Raffini, Pediatrics 2009

Quer saber mais sobre este trabalho ou contribuir com informações importantes para este estudo? Entre em contato com o Dr. Leonardo Campos pelo e-mail tromboped@gmail.com